


ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS



ALERNEX® TABLETAS. Antialérgico y antihistamínico para perros y gatos.

LINIMENTO BLANCO. Loción. Analgésico y Antiflogístico. Uso externo.

POMADA ALFA® Analgésico, antiflogístico, antiinflamatorio tópico.

PREDNI-ZOO® 5 / 20 Antialérgico y antiinflamatorio para perros y gatos.

SPECTRA-DOL® Solución inyectable. Analgésico – anti-inflamatorio – antipirético.

SPECTRA-DOL GOTAS® Solución oral. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético para perros y gatos.



ALERNEX®
ANTIALÉRGICO Y ANTIHISTAMÍNICO
PARA PERROS Y GATOS
Tabletas
Registro ICA 6543-MV



COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Clorfeniramina maleato 5 mg

Excipientes c.s.p. 1 tableta

INDICACIONES: En perros y gatos para el tratamiento de las reacciones alérgicas.

DOSIS: En perros con peso mayor de 5 kilogramos administrar una tableta de 5 mg (4 - 8 mg de clorfeniramina maleato como dosis total), vía oral cada 8 - 12 horas, según criterio del Médico Veterinario.

En gatos: administrar media tableta (2 - 4 mg de clorfeniramina maleato) como dosis total, vía oral cada 12 horas, según criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN:

Oral. Se recomienda administrar con la comida, sin que se disuelva antes de la ingestión.

Tratamiento	Perros	Gatos
Alergia y prurito	1 tableta de Alernex dos a tres veces al día.	1/2 Tableta de Alernex dos veces al día.

Parámetros de monitorización:

Eficacia clínica y efectos adversos.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Caja por 10 y 30 tabletas



LINIMENTO BLANCO

ESTIMULANTE DE MÚSCULOS,
TENDONES Y ARTICULACIONES

Loción
Reg. ICA 755-DB



COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen

Amoniaco	6 mL
Trementina	20 mL
Alcanfor	1.5 g
Cloruro de amonio	2.25 g
Ácido oleico	2.25 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

USO EN: BOVINOS Y EQUINOS

INDICACIONES: En **bovinos** y **equinos** como analgésico y antiflogístico.

Fricción analgésica y antiflogística de uso externo, especial en la recuperación de la función músculo-esquelética en los animales que han permanecido inmóviles (en pesebrera) o acostados durante largo tiempo como en síndrome de vaca caída, cirugías y de aquellos que presenten calambres, contusiones y espasmos que les impidan el normal desplazamiento o no puedan ponerse en pie.

Reduce el trauma muscular por exceso de peso al estimular la reactivación de la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos y masas musculares.
En **equinos**, aumenta la elasticidad, la potencia y el tono muscular para mejorar la capacidad motora y obtener máximo rendimiento.

ADMINISTRACIÓN: Con una cantidad generosa hacer un masaje enérgico sobre las masas musculares, ejercitar los músculos flexionando y extendiendo las extremidades durante 20 minutos. Repetir el tratamiento, si es necesario.

En **equinos**, antes y después del ejercicio, aplicar en abundancia sobre las masas musculares y friccionar hasta que desaparezca completamente.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

PRESENTACIÓN: Frasco aerosol por 500 mL.



POMADA ALFA®
ANTIINFLAMATORIA,
ANTIFLOGÍSTICA, Y ANALGÉSICA
Pomada
Reg. ICA 294-DB



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen

Mentol	1.000 mg
Alcanfor	5.000 mg
Guayacol	3.000 mg
Salicilato de metilo	10.000 mg
Trementina	3.000 mg
Excipientes c.s.p.	100 g

**USO EN: EQUINOS - BOVINOS - OVINOS
CAPRINOS - PORCINOS - PERROS - GATOS**

INDICACIONES: Antiinflamatoria, antiflogística y analgésica. Indicada en la inflamación y dolor de músculos, tendones, huesos, articulaciones y glándula mamaria, en todas las especies.

ADMINISTRACIÓN: Con una cantidad generosa de Pomada Alfa® hacer masaje sobre las partes afectadas. Repetir el tratamiento tres veces al día hasta que el dolor y la inflamación hayan desaparecido completamente.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

PRESENTACIONES:

Tubo colapsible por 60 g. Frascos por 250 g y 350 g.



PREDNI-ZOO® 5/20

ANTIALÉRGICO Y
ANTIINFLAMATORIO
PARA PERROS Y GATOS
Tabletas
Reg. ICA 5786-DB y 5686 DB



COMPOSICIÓN: Cada TABLETA de Predni-Zoo® 5 contiene

Prednisolona base 5 mg

Excipientes c.s.p 1 tableta

Cada TABLETA de PREDNI-ZOO® 20 contiene

Prednisolona base 20 mg

Excipientes c.s.p 1 tableta

USO EN: PERROS - GATOS

INDICACIONES: En **perros y gatos**, como antiinflamatorio en patologías de origen no infeccioso y en afecciones alérgicas. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

DOSIS

En reacciones alérgicas e inflamatorias: 0,5 - 1 mg/kg de peso, diariamente.

En entidades autoinmunes y terapia antineoplásica: 2 - 4 mg/kg de peso, diariamente.

Terapia de reemplazo: 0,25 mg/kg de peso, diariamente.

ADMINISTRACIÓN: Oral.

Protocolos especiales: Existen condiciones particulares en las cuales las dosis deben ser ajustadas (cada 12 horas, mayores dosis), pero siempre respetando los protocolos de disminución gradual (cada 24 horas) y la administración en días alternos (según el caso). En lo posible, ajustar la administración al ritmo circadiano del animal.

Parámetros de monitorización: La monitorización de la terapia glucocorticoidea depende del uso, dosis y esquema de dosificación utilizado (diaria vs. dosis en días alternos), duración de la terapia, edad y condición del animal. Los muestreos séricos y los efectos adversos observados orientan el juicio de su uso clínico.

PRECAUCIONES: Seguir las instrucciones de dosificación y no suspender abruptamente el tratamiento sin consultar al Médico Veterinario.

No administrar a hembras en estado de gestación.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Caja por 10 y 30 tabletas.



SPECTRA-DOL®

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
Solución inyectable
Reg. ICA 7966-MV



DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio del grupo AINE, inhibidor de las ciclooxigenasas con acción selectiva de 90% sobre COX-2, con mínimos efectos adversos sobre tejidos altamente sensibles a los demás antiinflamatorios.

COMPOSICIÓN: Cada mL de SPECTRA-DOL® contiene

Meloxicam 20 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES: En **bovinos, equinos y porcinos** como analgésico y antiinflamatorio en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos. Reduce la inflamación y dolor antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES: Evitar el uso del producto en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, debido a que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No administrar al mismo tiempo con glucocorticoides ni con otros antiinflamatorios no esteroidales. No utilizar en animales gestantes o menores de 6 meses de edad. No utilizar en animales con deficiencia hepática, cardíaca o renal, o con alteraciones hemorrágicas o gastrointestinales.

EFFECTOS SECUNDARIOS: En algunos casos puede haber tumefacción ligera y transitoria en el sitio de inyección. En **equinos** puede haber reacciones anafilácticas que deben ser tratadas sintomáticamente.

DOSIS: Equinos: Aplicar 3 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,6 mg/kg de peso). Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.

Bovinos: aplicar 2.5 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,5 mg/kg de peso). El tratamiento puede repetirse cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Porcinos: aplicar 2 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,4 mg/kg de peso). Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Equinos: Vía intravenosa. **Bovinos:** Vía subcutánea o intravenosa. **Porcinos:** Vía intramuscular.

Dosis de SPECTRA-DOL® según especie y peso:

Especie **Peso animal** **Dosis de** **Vía de SPECTRA-DOL®**
administración

Equina	100 kg	3 mL	IV	Bovina	100 kg	2.5 mL	IV o SC
	200 kg	6 mL	IV		200 kg	5 mL	IV o SC
	300 kg	9 mL	IV		300 kg	7,5 mL	IV o SC
Porcina	100 kg	2 mL	IM	400 kg	10 mL	IV o SC	
	200 kg	4 mL	IM	500 kg	12,5 mL	IV o SC	
				600 kg	15 mL	IV o SC	

PRECAUCIONES: En caso de producir efectos secundarios suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario. La seguridad de su uso en animales en gestación o lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no debe destinarse para consumo humano. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frascos viales por 10, 50 y 100 mL.



SPECTRA-DOL GOTAS®

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO
Y ANTIPIRÉTICO PARA PERROS Y GATOS

Solución oral
Reg. ICA 8638-MV



DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio del grupo AINE, inhibidor de las ciclooxigenasas con acción selectiva de 90% sobre COX-2. Tratamiento efectivo del dolor e inflamación en artritis, osteoartritis felina y canina, miositis, tendinitis, otitis y faringitis entre otras. Coadyuvante en el tratamiento de infecciones respiratorias para aliviar la fiebre, el dolor, la inflamación y la dificultad respiratoria, al tiempo con la terapia antibacteriana indicada. En dolores musculares y esqueléticos causados por heridas quirúrgicas, traumáticas, ejercicio intenso y en algunas cojeras. En pseudo-preñez para el tratamiento de la inflamación y dolor de la glándula mamaria (mastitis). Tratamiento sintomático de enfermedades que causan fiebre al tiempo con la terapia específica indicada.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de SPECTRA-DOL GOTAS® contiene

Meloxicam 150 mg

Excipientes c.s.p 100 mL

INDICACIONES: En **perros y gatos** como analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

En trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.

Reduce la inflamación y el dolor, antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos, como reducción de fracturas, laparotomías, ovario-histerectomías y orquiectomías.

CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, debido a que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No administrar al mismo tiempo con glucocorticoides ni con otros antiinflamatorios no esteroideos. No usar en animales en gestación o lactancia. No administrar a animales con trastornos gastrointestinales (gastroenteritis), hemorragias gastrointestinales, deterioro de la función hepática, cardíaca o renal. No administrar a **perros** menores de 6 semanas de edad o a **gatos** con peso inferior a 2 kg.

DOSIS: Administrar por vía oral 0,1 - 0,2 mg por cada kg de peso equivalente a 2 gotas (0,15 mg de meloxicam) por cada kilogramo de peso, cada 24 horas. La dosis y duración del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario. Una vez alcanzado el efecto terapéutico, la dosis puede disminuirse a la cantidad efectiva.

Dosis de SPECTRA-DOL GOTAS®, según el peso

Peso 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 40 kg

Gotas 4 10 20 40 80

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con el alimento o directamente en la boca.

MECANISMO DE ACCIÓN

Efecto analgésico: Se ejerce a través del bloqueo de la sensibilidad de los receptores del dolor producida por la inflamación a través de prostaglandina E y F.

Efecto antiinflamatorio: Se debe a disminución de la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición preferencial de la ciclo-oxigenasa 2 (COX 2).

Efecto antipirético: Consiste en retomar al punto de calibración normal la temperatura corporal en el hipotálamo, al suprimir la síntesis de prostaglandina E2 en los núcleos periventriculares y próximos al hipotálamo.

PRECAUCIONES: Administrar al tiempo con la alimentación. En caso de producir efectos secundarios suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario. La seguridad de su uso en animales en gestación o lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario. Consulte al Médico Veterinario. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Frasco gotero por 10 mL, 20 mL y 30 mL.

